



Frelon asiatique

Signalement et destruction de nids primaires



nid primaire.
5 à 10 cm.

nid secondaire.
60cm à 1m.

Nid primaire (fin d'hiver jusqu'à juin)

- Taille de la balle de ping-pong à celle d'une orange. Logé sous un abris (auvents, hangars, encadrements portes, etc.).
- **1 reine, de 10 à 100 frelons.**

Nid secondaire (Juin)

- Sphérique. Diamètre 60 cm - 1m. En hauteur dans les arbres.
- 1 reine, de 4000 à 6000 frelons, 300 futures reines.



Printemps, destruction des nids primaires

- Repérage des nids primaires.
 - **Logés sous des abris** (auvents, hangars, encadrements portes, etc.)
 - Les nids primaires sont **utilisés pendant environ 2 mois.**
- Destruction :
 - Signalement
 - Destruction par une personne formée

Construction d'un nid primaire, évolution en 2 semaines.
Taille : entre une balle de ping pong et une orange.



La reine est seule pour construire son nid. Elle part à la recherche de nourriture sucrée. Elle est vulnérable et peut être piégée facilement.



Repérage des nids primaires



Inspecter
régulièrement ces
endroits.
Repérer d'éventuelles
allées et venues de
frelons.

Période : **avril à fin juin**
Inspection : **une fois
par semaine**

- Signaler la présence du nid primaire à la mairie :
 - Lieu, endroit où le nid est situé (avancée de toit, balcon, etc.), hauteur , accessibilité
 - Activité du nid (les premiers frelons naissent environ 6 semaines après l'installation du nid)
 - Reine seule, sans frelons déjà nés
 - Reine avec des frelons
- Destruction par une personne informée / formée. Vous pouvez facilement vous informer / former pour le détruire vous-même :
 - Demandez conseil auprès de la mairie
 - Vidéo qui explique comment faire :
<https://www.youtube.com/watch?v=uacEv335O8>


La technique la plus simple est la "Méthode du contenant" .

1. Utiliser un bocal à cornichons ou un pot à confiture avec couvercle, éventuellement accompagné d'un sac transparent.
2. Approcher le bocal et l'enfiler doucement sur le nid.
3. Déplacer latéralement pour briser le pilier d'attache.
4. Refermer immédiatement dès que le nid tombe au fond.
5. Placer le bocal au congélateur pour éliminer l'insecte, ou laisser le bocal au soleil.

Destruction d'un nid primaire.



Déplacer latéralement pour briser le pilier d'attache. Refermer immédiatement dès que le nid tombe au fond du bocal.



Approcher le bocal et l'enfiler doucement sur le nid.

https://www.youtube.com/watch?v=_uacEv335O8



Placer le bocal au congélateur pour éliminer l'insecte, ou le laisser au soleil.